



Cabinet d'orthodontie du Dr SLASSI

31 boulevard Dupuy 01100 OYONNAX

04.74.77.65.40

dr.slassi@outlook.fr

DISJONCTEUR



Le nombre d'activations dépendra de la prescription du Docteur. Elles seront à faire **1 fois par jour** par un de tes parents (voir au verso)

Il se peut que tu ressenties de légères douleurs au moment de l'activation, si c'est le cas tu peux prendre un anti-douleur (ex : Doliprane) 1H avant l'activation.

Ce que tu peux ressentir :

- légers étirements au niveau de la mâchoire supérieure et au niveau du nez (sinus)
- dans de très rare cas des saignements de nez sont possible, PAS D'INQUIETUDE.

Après la fin des activations, l'appareil reste en bouche **9 mois** pour permettre à l'os de se consolider.

ATTENTION ! Tu dois avoir une hygiène bucco-dentaire irréprochable, c'est-à-dire bien te brosser les dents 3 fois par jour : **MATIN MIDI** (si tu manges à la cantine, tu te brosseras les dents après ton goûter) et **SOIR**.

Sans oublier de brosser le palais !!

Ne manges pas d'aliments trop durs ou collants qui pourraient abîmer ton appareil.


Si ton appareil est abîmé ou cassé, il faudra le faire refaire par le prothésiste (laboratoire) et cela sera à la charge de tes parents sur devis **sans prise en charge sécurité sociale ni mutuelle.**




Il faut que tu ouvres grand la bouche pour que tes parents puissent bien voir le point d'insertion de la clé.



Insérer la clé sur le point (trou) du haut jusqu'à la butée. La clé doit tenir toute seule.



Descendre en direction de la gorge jusqu'à que ça bloque. La clé va se plier.



Enlever la clé en appuyant sur la langue. **ATTENTION**, ne surtout pas enlever la clé en relevant vers le haut, cela annule l'action précédente.